脐带间充质干细胞外泌体治疗卵巢早衰的效果评价

郭仕杰

上海芊逸生物医药有限公司 上海 201306

【摘　要】：卵巢早衰是育龄女性高发难治性内分泌疾病，临床统计显示该病可发生于育龄各个阶段，且近年年轻化发病占比超20%，严重损害女性身心健康，现有疗法难以实现卵巢功能根治，仅能缓解临床症状。脐带间充质干细胞外泌体凭借优异的组织修复与免疫调节潜能成为新型干预方向，但制剂稳定性、靶向能力及免疫适配性三大问题制约临床落地，本文围绕现存短板，从原料管控、制备规范、靶向修饰、给药优化到免疫调控多维度设计方案，基于卵巢生理功能、内分泌水平与生殖预后三方面完成疗效验证，系列优化策略可有效补齐技术缺陷、提升外泌体应用效能，为该疗法临床转化与规范应用提供可行参考。

【关键词】：脐带间充质干细胞外泌体；卵巢早衰；制剂优化；靶向修饰；疗效核验

DOI:10.12417/2811-051X.26.13.006

引言

育龄女性早发性卵巢功能不全发病率约 1%-4%，且发病呈现年轻化趋势，传统干预仅能缓解症状，对卵巢器质性损伤缺乏逆转能力，脐带间充质干细胞外泌体依托独特生物学优势，已在再生医学领域占据干预卵巢早衰的前沿位置，但目前这项技术仍面临制剂品质不均、靶向效率不足及免疫适配不稳定等现实阻碍，实际应用受到制约，借助标准化工艺、靶向改造与免疫协同调控思路优化技术体系，同时开展多维度疗效验证，可破解现存难题，推动该疗法走向临床规范化与安全化。

1 脐带间充质干细胞外泌体干预卵巢早衰研究基础

卵巢早衰作为高发妇科内分泌问题，会引发卵泡大量闭锁、卵巢结构损伤与内分泌功能紊乱，现有临床方案仅能缓解症状，无法实现卵巢功能彻底修复，脐带间充质干细胞取材便捷、免疫排斥风险低，其所分泌的外泌体直径处于 30 至 100 纳米区间，囊内包含微小 RNA、活性蛋白及多种生长因子，可独立完成细胞间信号传递[1]。这类外泌体主要靶向卵巢颗粒细胞，调控细胞增殖与凋亡的动态平衡，同时调节局部炎症反应与免疫状态，优化卵巢生存微环境，动物实验证实其能够修复受损卵巢组织，增加各级卵泡数量，恢复激素正常分泌水平，改善生殖功能，凭借安全稳定的特性，该外泌体已成为卵巢早衰再生干预的重要研究方向。

2 脐带间充质干细胞外泌体治疗卵巢早衰现存制约因素

2.1 制剂理化稳定性存在个体差异化短板

脐带间充质干细胞外泌体属于生物活性制剂，理化性质易受制备、储存及外界环境干扰，未标准化工艺制备的外泌体批次活性差异显著，整体有效活性波动幅度可达 20%-35%，批次间差异明显，不同培养体系与细胞生长状态会导致外泌体粒径、活性物质载量出现波动，外泌体囊膜结构较为脆弱，在常规保存和转运中容易破损，内部功能性微小 RNA 与活性蛋白随之流失，药效被削弱[2]。分离纯化工艺的差异还会改变外泌体纯度，混入的杂质同样干扰生物活性，造成不同制剂作用效果参差不齐，这种理化性质上的不统一破坏了临床用药的一致性与疗效稳定性，也阻碍制剂标准化生产及规范应用，成为该疗法走向实际应用必须解决的基础难题。

2.2 卵巢靶向富集作用效能存在局限性

外泌体进入机体后难以高效定向聚集于卵巢病灶部位，靶向能力存在明显不足，静脉输注后外泌体大多富集于肝脾等网状内皮系统，到达卵巢组织的占比很低，随体液循环分散至全身多处组织，仅少量能够完成定向迁移并停留于卵巢间质，大部分有效成分无法作用于受损卵泡与颗粒细胞，利用效率被大幅拉低，常规静脉或腹腔给药方式下，外泌体易被机体代谢系统清除，难以在卵巢局部形成有效药物浓度，即便部分外泌体完成归巢，也多分布在卵巢基质区域，很难穿透组织屏障深入卵泡内部发挥修复作用，靶向能力不足不仅削弱治疗效果，还需通过增加给药剂量与频次来弥补，无形中推高应用成本，也增加机体接触外源生物物质的潜在风险。

2.3 机体免疫微环境适配性存在波动问题

卵巢早衰患者常伴随局部炎症与免疫功能紊乱，其中自身免疫相关诱因可占部分病例的 4%-30%，外泌体与机体免疫微环境的适配状态并不稳定，部分患者体内炎症因子处于高表达水平，异常免疫细胞会对外泌体产生干扰，阻碍其发挥细胞调控与组织修复作用，外泌体虽免疫原性较低，但在不同个体体内依旧会引发程度不一的免疫应答，打破卵巢局部已有的免疫平衡，针对自身免疫因素引发的卵巢早衰，这种适配波动表现得更为明显，免疫紊乱会持续损伤卵泡与颗粒细胞，抵消外泌体的修复效果，免疫微环境的动态变化让外泌体的作用效果难以维持稳定，也增加治疗效果的不可预测性，制约该疗法的临床普及。

3 优化脐带间充质干细胞外泌体治疗卵巢早衰效能适配路径

3.1 标准化工艺调控提升外泌体制剂稳定程度

（1）原料筛选管控：原料品质作为决定脐带间充质干细

胞外泌体理化稳定性的核心前提，要求构建覆盖全维度的筛选与质控体系，从源头对脐带组织来源实施严格甄别，优先挑选生理状态良好且无病原体污染的材料，借此规避外源杂质可能带来的干扰。进入干细胞培育阶段后需持续监测细胞形态、增殖能力及分化潜能，确保细胞处于稳定的生长周期，同时淘汰活性异常或增殖速率波动的细胞株，因为不同生长阶段的干细胞所分泌的外泌体在粒径与活性物质含量上存在明显差异，因此必须划定统一的细胞传代区间，仅选用传代稳定的细胞开展后续培养，同步检测干细胞表面标志物的表达水平以把控细胞纯度，避免杂细胞混入体系。规范的原料筛选能够缩小不同批次外泌体的品质差距，减少因细胞状态差异引发的制剂活性波动，为后续制备环节打下坚实基础，保障最终成品理化性质趋于统一。

（2）制备流程规范：标准化制备流程对于消除批次差异并维持外泌体理化特性属于关键环节，需要设定统一培养环境参数，将温度、气体浓度及培养基配比固定在既定标准范围内，保证干细胞分泌外泌体的过程保持高度一致。收集细胞培养液后严格执行分级离心操作，分步去除细胞碎片与大型囊泡等杂质，逐步提升外泌体纯度，同时将离心转速、时长及环境温度等参数全程固化，避免操作偏差破坏外泌体膜结构，防止内部功能性蛋白与微小 RNA 出现流失。完成分离后统一采用合规保存体系，严格控制储存温度与分装规格，降低转运和存放过程中外泌体破损概率，全流程规范化操作能够最大程度保留外泌体生物活性，缩小不同批次制剂间的理化差异，让成品稳定性与均一性满足应用要求，适配后续临床使用的统一标准。如图 1。



图 1 脐带间充质干细胞外泌体制备关键质控节点示意图

3.2 靶向修饰改良强化卵巢病灶富集能力

（1）表面载体改造：对脐带间充质干细胞外泌体开展表面载体改造，成为强化其卵巢靶向富集能力的核心方式，结合外泌体天然膜结构与卵巢组织识别特点，在囊膜表面整合特异性靶向配体与功能载体，可引导外泌体在体液循环中精准作用于卵巢间质与受损卵泡，减少其他器官的无效滞留。改造操作必须严格保护外泌体结构与生物活性，防止囊膜破损及内部活性物质流失，经过修饰的外泌体能够依靠靶向结合作用延长卵巢局部停留时间，提升病灶处有效浓度，同时载体改造还能优化外泌体的体内循环状态，降低被机体快速代谢清除的概率。该技术从分子层面弥补天然外泌体分布分散的固有短板，使有效成分集中作用于损伤部位，稳定调控卵巢颗粒细胞生理状态，全面提升整体干预效能。

（2）给药方式调整：优化给药路径能够直接改善外泌体在卵巢的富集效果，打破传统给药模式存在的效能短板，因为传统全身性给药会让外泌体随血液循环广泛分布，难以在卵巢形成有效蓄积。结合卵巢的解剖位置与生理特点，优先选用局部给药搭配低频次全身给药的组合模式，局部给药可直接将外泌体输送至卵巢周边区域，大幅缩短转运路径并减少途中损耗，保障外泌体直接作用于病灶[3]。针对不同身体状态的受众还可灵活调整给药频次与单次使用剂量，在维持局部有效药物浓度的同时规避过量使用带来的潜在负担，相较于单一给药形式，多元化给药方案能够平衡富集效率与使用安全性，减少外泌体在全身的无效消耗，持续维持卵巢局部的有效作用浓度，保障外泌体对卵泡和卵巢组织的修复作用稳定发挥，让靶向富集的实际效能得到充分释放。

3.3 联合调控手段调和机体卵巢免疫微环境

（1）局部环境调节：针对卵巢局部紊乱的免疫与炎症状态开展靶向调节，能够为脐带间充质干细胞外泌体营造适宜的作用环境，卵巢早衰会伴随炎症因子异常表达及免疫细胞比例失衡，持续损伤卵泡与颗粒细胞并干扰外泌体生物学功能的正常发挥。通过局部介入方式调控卵巢周边炎症水平，抑制炎性介质持续释放，缓解组织炎性浸润，逐步修复失衡的局部免疫格局，同时依托辅助手段改善卵巢间质微循环与组织营养供给，助力外泌体稳定定植并释放活性物质。在此基础上引导局部免疫细胞恢复正常功能状态，提升调节性免疫细胞占比，弱化异常免疫反应对卵巢组织的持续攻击，而局部环境的持续优化能够减少外界干扰因素对外泌体活性的影响，让其顺利完成对颗粒细胞增殖与凋亡的调控，充分释放修复潜能并保持干预效果稳定，规避因局部免疫波动造成的疗效起伏。

（2）全身状态干预：卵巢免疫微环境的失衡往往和全身免疫状态密切相关，开展系统性干预可从根源巩固局部调节成果，卵巢早衰人群普遍存在全身免疫机能紊乱，单纯进行局部调理难以维持长期稳定，因此需要建立整体性的调节方案。通过科学的调理方式平衡全身免疫细胞分布，纠正异常免疫应答，降低机体对外源生物制剂的应激反应，提升外泌体与机体的整体适配度[4]。同时兼顾内分泌整体稳态的维护，因为激素水平的紊乱会进一步加剧免疫失衡，协同调节全身内分泌网络能够反向辅助卵巢局部免疫环境恢复。全身干预与局部调节形成联动体系后可减少免疫状态反复波动的情况，降低异常免疫反应抵消外泌体修复作用的概率，构建长期稳定的体内环境以保障外泌体在多次干预周期中持续发挥作用，全面提升整体治疗的稳定性与长效性。

4 脐带间充质干细胞外泌体治疗卵巢早衰临床作用核验

4.1 卵巢基础生理功能修复效果核验

卵巢基础生理功能主要由卵泡发育、组织结构及颗粒细胞活性共同维系，成为评价脐带间充质干细胞外泌体干预效果的核心指标，卵巢早衰发病后患者卵巢内超过 70%的原始卵泡会发生病理性闭锁，引发各级卵泡数量大幅减少、卵泡结构异常，同时造成颗粒细胞大量凋亡并最终导致卵巢组织萎缩。临床效果评估可围绕卵巢形态、各阶段卵泡数量以及颗粒细胞增殖与凋亡状态展开，外泌体能够修复受损的卵巢组织结构，改善器官萎缩状态，减少卵泡闭锁并增加不同发育阶段卵泡的数量，而作为卵泡功能的重要支撑，颗粒细胞的生理状态直接决定卵巢运转能力，外泌体可稳定颗粒细胞活性并维持卵泡结构完整。对相关指标进行持续监测能够直观体现卵巢组织的修复水平与生理机能恢复情况，为该疗法的临床落地提供可靠的功能学支撑。

4.2 女性内分泌激素水平改善效果核验

内分泌紊乱是卵巢早衰的典型临床表现，激素水平的动态变化则成为评估干预效果的重要量化指标，卵巢功能衰退后患者卵泡刺激素水平可较健康人群升高 2-4 倍，雌二醇、抗苗勒管等关键激素分泌量大幅下降，激素分泌节律彻底失衡。对外泌体干预后的激素水平进行常态化监测能够精准判断内分泌系统的恢复情况，随着外泌体持续发挥作用，卵巢分泌功能逐步恢复，雌二醇与抗苗勒管含量稳步回升，卵泡刺激素逐步回落至合理区间，各项激素逐步回归正常分泌节律[5]。激素水平的改善不仅可缓解潮热、情绪波动等早衰相关躯体症状，也代表卵巢内分泌轴逐步恢复运转，通过长期跟踪激素指标的变化幅度与稳定性，能够客观评判外泌体对内分泌系统的调节能力，区分短期改善与长效恢复之间的差异。

4.3 卵巢早衰机体生殖预后状态核验

生殖预后主要包含受孕能力、妊娠维持以及子代相关情况，成为检验外泌体临床价值的最终落脚点，卵巢早衰会严重削弱卵泡发育与排卵能力，未经干预人群自然妊娠多处于 5%-10%较低水平，并直接造成受孕概率大幅下降，即便成功受孕也会因卵巢功能不足增加妊娠风险。在完成外泌体干预后可长期追踪受孕概率、妊娠周期以及整体生殖状态，卵巢功能修复后卵泡发育趋于正常，排卵功能逐步恢复，自然受孕的概率会得到明显提升，同时卵巢分泌的各类激素可为妊娠过程提供支撑，降低孕期不良事件的发生概率。对生殖预后的核验需要拉长观察周期，综合评估短期受孕情况与长期生殖健康，全面判断外泌体对卵巢早衰人群生殖能力的修复作用，该项评估能够明确疗法在生殖领域的实际应用价值，也是推动该疗法走向临床应用的重要参考依据。

5 结语

脐带间充质干细胞外泌体在卵巢早衰干预中具备突出潜力，但制剂稳定性、靶向富集以及免疫适配等问题限制其临床应用，依托原料管控与流程标准化提升制剂品质，借助表面修饰及给药调整增强靶向能力，搭配局部与全身调控平衡免疫微环境，能够有效完善技术体系。从卵巢生理、内分泌、生殖预后多维度开展效果核验可客观评判干预价值，整套优化方案能够补齐技术短板并推动该疗法走向规范化应用，也为卵巢早衰再生修复领域的发展提供可行思路。

参考文献：

[1] 陈杰.人脐带间充质干细胞外泌体对小鼠卵巢早衰治疗作用的研究[D].内蒙古医科大学,2025.

[2] 李哲.脐带间充质干细胞及其外泌体对卵巢早衰小鼠卵巢功能影响的研究[D].湖北医药学院,2025.

[3] 王聪,周建政.间充质干细胞来源的外泌体治疗早发性卵巢功能不全的研究进展[J].中国性科学,2024,33(7):35-39.

[4] 王军陶.脐带间充质干细胞外泌体抑制顺铂对人卵巢颗粒细胞损伤的实验研究[D].郑州大学,2022.

[5] 李仲康.人脐带间充质干细胞来源外泌体改善卵巢功能的效果评价及机制探究[D].河北医科大学,2022.